



ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI
in collaborazione con L'INSTITUT AGRICOLE REGIONAL

AVVISO AI FRUTTICOLTORI

Comunicato n°8 del 27 maggio 2008

TICCHIALATURA

A causa delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di infezioni primarie di ticchialatura (rischio medio-grave), si consiglia nei frutteti di melo e pero dove negli ultimi 5 giorni non sia stato effettuato un trattamento con fungicidi preventivi contro questa avversità, di intervenire al più presto con prodotti a base di:

METIRAM (Poliram DF, ecc.) oppure **MANCOZEB** (M70DF, ecc.) oppure **DITHIANON** (Delan 70wg, Gladiol wdg, ecc.)

I ditocarbammati (Metiram e Mancozeb) sono autorizzati sino al 15 di giugno

Da miscelare con un **IBE** quale :

Tebuconazolo (Folicur se), **Miclobutanil** (Thiocur forte), **Difenoconazolo** (Score), **Bitertanolo** (Proclami) ecc.

Gli IBE sono autorizzati al massimo 4 volte all'anno e vanno usati in miscela con uno dei prodotti sopra citati

In alternativa alla soluzione precedente si può utilizzare il **Pyrimethanil** (Scala, ecc.), o **Cyprodinil** (Chorus, ecc.)

Prodotti del gruppo anilopirimidine autorizzate al massimo 4 volte all'anno

OIDIO

Nel trattamento su melo se non si usano IBE che sono efficaci anche contro l'oidio bisogna inserire anche un prodotto **antioidico** tipo Bupirimate (Nimrod) oppure Quinoxifen (Arius) oppure uno zolfo bagnabile (Tiovit, Microthiol diperss, ecc.).

N.B. Si ricorda che anche al di fuori del periodo della fioritura degli alberi da frutta è necessario sfalciare le erbe fiorite presenti sotto la chioma prima di applicare qualsiasi trattamento fitosanitario

Per maggiori informazioni telefonare al Servizio fitosanitario : segreteria 0165/275385) - tecnico responsabile : 0165-275308 o 3400634624.

IL TECNICO

Sandro DALLOU

L'ISTRUTTORE TECNICO
Rita BONFANTI