

**REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. 852/2004, ART. 6, COMMA 2  
PRODUZIONE PRIMARIA, SEZIONE ALLEVAMENTO**

Le informazioni sotto riportate integrano, con riferimento alla materia sanitaria, quanto contenuto nel **Provvedimento dirigenziale n3490 del 25/06/2021** avente per oggetto: "Approvazione delle linee guida con riferimento al procedimento 'Attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale' e relative procedure informatizzate da attivare sul portale internet dello Sportello unico degli enti locali", a cui si rimanda per ogni ulteriore indicazione.

**REQUISITI MINIMI**

Per allevare animali devono esserci a disposizione:

- strutture idonee per il ricovero, a meno che non si tratti di allevamento brado e semibrado
- strutture per il deposito mangimi/fieno,
- deposito stoccaggio letame (concimaia) se gli animali ricoverati superano le 2 Unità Bovina Adulta o opportuno sistema di gestione dei reflui, es. ditta autorizzata che ritira il refluo.

La concimaia può essere anche di un'altra azienda, ma deve avere la capacità idonea a contenere il refluo di entrambe le aziende; l'allevatore ove possibile può utilizzare la concimaia comunale, a seguito di apposita convenzione.

Di seguito la tabella di conversione degli UBA

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini di età superiore a 10 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 10 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 6 mesi	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003

**STRUTTURE RICOVERO ANIMALI**

Sono idonee le strutture aventi:

- pareti e pavimentazione lavabili e disinfettabili,
- idonea aerazione ed illuminazione naturale e/o artificiale,
- dimensioni in rapporto alla specie e alla categoria allevata.
- zona di isolamento/infermeria per isolamento sanitario e/o esecuzione terapie
- disponibilità di acqua pulita per l'abbeverata

**N.B. la zona/stalla di isolamento allorquando si produce latte, deve poter ricoverare il 10% delle vacche in lattazione.**

**N.B. se si produce latte è necessario un locale per il lavaggio ed il deposito delle attrezzature,** avente acqua calda e fredda, l'acqua utilizzata deve essere potabile; se il latte è stoccato in azienda oltre le 2 ore dalla mungitura è necessario un tank di refrigerazione sito in locale lavabile e disinfettabile, diverso dai locali di stabulazione.

### **CONCIMAIA**

È necessaria una corretta gestione dei reflui zootecnici che possono essere depositati temporaneamente su nudo terreno soltanto dopo uno stoccaggio minimo di 90 gg.

La concimaia deve essere dimensionata a seconda della tipologia di reflui zootecnico (letame o liquame) e del numero degli animali detenuti.

Si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche:

LETAME prodotto da bovine di razza valdostana (peso medio 500 Kg):

MC deposito= (N° UBA \* 1,45 \* 3) + 10% (acque meteorologiche) + pozzettone per liquidi

Il pozzettone deve avere la seguente volumetria:

- (N° UBA 0,375 \* 1) se gli animali detenuti sono <63UBA
- (N° UBA **0,375** \* 3) se gli animali detenuti sono >63UBA

LIQUAME: prodotto da bovine di razza valdostana (peso medio 500 Kg)

MC deposito= (N° UBA \* 1,38 \* 3) + 10% (acque meteorologiche) + pozzettone per liquidi

Il pozzettone deve avere la seguente volumetria:

- (N° UBA 0,156 \* 1) se gli animali detenuti sono <63UBA
- (N° UBA **0,156** \* 3) se gli animali detenuti sono >63UBA

Il suddetto dimensionamento minimo di 90 giorni di stoccaggio non si applica ai contenitori per lo stoccaggio dei liquami asserviti ai fabbricati utilizzati per il pascolamento negli alpeggi e nei mayen, in quanto nel periodo estivo di accumulo l'effluente fertirrigante è utilizzabile immediatamente in funzione della turnazione del pascolamento, mediante appositi sistemi di fertirrigazione.

### **DEPOSITO STOCCAGGIO MANGIME**

**N.B. nella definizione mangime sono compresi i foraggi**

I mangimi devono essere conservati in luogo idoneo al riparo dalle contaminazioni fisiche e biologiche (altri animali)

### **SITUAZIONI PARTICOLARI**

Produzione uova: è necessario un locale asciutto e pulito per lo stoccaggio delle uova.

Elicicoltura: è necessario un locale/zona asciutta e pulita per lo spurgo delle chiocchie

**N.B.: il presente opuscolo NON presenta tutte le possibili condizioni necessarie per l'allevamento di specie particolari,** i Veterinari della S.C. Igiene Allevamenti territorialmente competenti sono a disposizione dell'utenza per ulteriori informazioni.

[Consultare il link](#)

**N.B. dopo aver attivato il codice aziendale presso l'USZ, il titolare deve dotarsi di registri dei farmaci per i trattamenti terapeutici (registro verde) e per i trattamenti terapeutici e zootecnici (registro rosa) e, ad eccezione dei bovini ed ovicaprini, del registro di carico e scarico.**

I suddetti registri sono da vidimare presso la S.C. igiene Allevamenti, Dipartimento di Prevenzione, Loc. Amerique 7/l, Quart (AO).

[Consultare il link](#)